

بوجاری و ضدعفونی بذور گندم و جو

کشاورزان گرامی

باتوجه به فرارسیدن زمان کاشت گندم و جو و نظر به اهمیت و جایگاه بذر در افزایش تولید ضرورت دارد بمنظور جلوگیری از گسترش و شیوع علف های هرز، آفات و بیماری ها از بذور گواهی شده استفاده گردد و در صورت استفاده از بذور خود مصرفی حتماً نسبت به بوجاری و ضدعفونی صحیح اقدام نمائید.

توصیه های فنی:

- ۱- جهت کشت گندم و جو از بذور گواهی شده استفاده گردد.
- ۲- در صورتی که از بذور گندم و جو خود مصرفی جهت کشت استفاده می نمائید ابتدا بذور را بوجاری نموده ودانه های چروکیده، پوک و بذر علفهای هرز را جدا و سپس بمنظور جلوگیری از آلودگی بذور گندم و جو به بیماری سیاهک(کورک) به روش زیر ضدعفونی نمائید.
هر ۱۰۰ کیلوگرم بذر گندم را با مقدار ۲۰۰ گرم از قارچکش های کاربندازیم، دیفنوکونازول، کاربوکسین تیرام و یا راکسیل مخلوط نمائید.
- ۳- برای ضدعفونی بذور جو ترجیحاً قارچکش اپیرودیون + کاربندازیم (رورال تی اس) استفاده گردد.
- ۴- بذور را روی پلاستیک یا سطح صاف و تمیز ریخته و پس از مرطوب نمودن بذور با آب بمنظور چسبندگی بهتر سم مورد نیاز را روی آن پاشیده و بذور را چندین بار زیرورو کرده تا کاملاً به سم آغشته گردد.
- ۵- بهترین زمان ضدعفونی بذور بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت قبل از کاشت می باشد.
- ۶- در هنگام ضدعفونی بذور از ماسک و یا پارچه جهت پوشاندن سر و صورت و دهان استفاده شود و از خوردن و آشامیدن حین عملیات ضدعفونی پرهیز شود.

