

بیماری زنگ زرد گندم

کشاورز گرامی:

باتوجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی جهت بروز بیماری زنگ زرد گندم و اهمیت خسارتزایی بیماری به نکات ذیل توجه فرمائید:

پیشگیری:


- ✓ مزارع خود را بطور منظم بازدید نمائید.
- ✓ با توجه به اینکه میزبان اولیه این بیماری ، علف های هرز حاشیه و داخل مزارع می باشند لازم است نسبت به حذف و معدوم نمودن آن ، سریعا اقدام نمائید.
- ✓ حتی الامکان از مصرف بیش از حد کود های از ته (سرک) خودداری نمائید زیرا باعث رشد بیش از حد ساقه و خوابیدگی (ورس) آن می شود.
- ✓ به محض مشاهده اولین علائم بروز بیماری (تاول یا جوش نارنجی رنگ در برگ های پائینی) بلافاصله نسبت به تهیه سم و سمپاشی بصورت لکه ای اقدام نمائید.

مبارزه شیمیایی:

- (۱) سم آلتو به میزان ۵/۰ لیتر در هکتار
- (۲) سم تیلت به میزان ۱ لیتر در هکتار
- (۳) سم فولیکور به میزان ۱ لیتر در هکتار

ملاحظه:

افزایش رطوبت و درجه حرارت باعث گسترش شدید بیماری می شود. حساس ترین مرحله خسارت مرحله ظهور برگ پرچم و مرحله تشکیل خوشه می باشد. هرچه شدت آلودگی روی برگ پرچم بیشتر باشد میزان خسارت وارده به محصول بیشتر است.



فروردین ماه ۹۸