

بیماری باکتریایی آتشک درختان میوه دانه دار

باغداران گرامی

با توجه به وقوع آلودگی بیماری آتشک درختان میوه دانه دار در باغات به و کلابی، بمنظور کنترل و جلوگیری از انتشار بیماری رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

الف - پیشگیری

- ۱) نهال های مورد نیاز را از مناطق عاری از آلودگی و از نهالستان های مورد تأیید سازمان جهاد کشاورزی تهیه گردد
- ۲) جلوگیری از استقرار کندو های زنبور عسل در باغهای آلوده .
- ۳) تغذیه صحیح درختان و جلوگیری از مصرف زیاد کود های از ته خصوصاً در تابستان
- ۴) مدیریت آبیاری در زمان گلدهی
- ۵) هرس در فصل زمستان که عامل بیماری غیر فعال است انجام گیرد و محل هرس با چسب باغبانی پوشانده شود
- ۶) حذف صحیح شاخه هاو سر شاخه های آلوده
- ۷) رعایت اصول بهداشتی باغ (کنترل علف های هرز ، جمع آوری بقایای گیاهی و سوزاندن آن ها
- ۸) کاشت حداقل تعداد ارقام در باغ برای کوتاه شدن دوره گلدهی
- ۹) تغییر در نوع محصول منطقه
- ۱۰) حذف گلها در درختان جوان

ب - کنترل بیماری

- ۱- هرس اندامهای آلوده ۲۰ سانتیمتر پایین تر از محل آلودگی و معدوم نمودن آنها
- ۲- ضد عفونی ادوات باغبانی با محلول (یک قسمت وایتکس + ۹ قسمت آب)

عملیات سمپاشی

اکسی کلرور مس ۳ در هزار یا بردوفیکس ۲-۱در صد یا کوپر نوردوکس ۱/۵ در هزار

- نوبت اول قبل از خزان برگها

- نوبت دوم قبل از گل دهی (تورم جوانه ها)

- نوبت سوم ، چهارم ، پنجم - موقعی که ۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ درصد شکوفه ها باز شدند .