

جلوگیری از خسارت بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در مزارع گندم و جو

کشاورزان گرامی

یکی از مشکلات گندم و جو در مناطقی که آب و خاک به سمت شوری می رود کاهش حجم و تعداد ریشه ها مخصوصاً کاهش تعداد ریشه های موئین در گندم و جو می باشد که در قسمت هوایی گیاه در مرحله ۸-۶ برگی بصورت زردی برگ های کناری و بروز لکه در روی برگ ها مشاهده می گردد. با درآوردن گیاهچه های گندم و جو از خاک مشاهده می گردد تعداد ریشه های اصلی و فرعی کاهش زیادی یافته است. این عارضه در مزارعی که بذور گندم و جو را بذرمال نموده اند کمتر مشاهده می شود. لذا توصیه می گردد بعد از بر طرف شدن خسارت سرما در مرحله ۸-۶ برگی گندم و جو جهت هر هکتار مقدار ۱۰-۱۵ کیلوگرم کود N.P.K 10-50-10 به همراه مقدار ۱-۲ کیلوگرم کود اسید هیومیک پودر جهت توسعه و تقویت سیستم ریشه گیاهان و همینطور بهبود پنجه زنی همراه با آب آبیاری استفاده گردد.

بدیهی است استفاده از توصیه بالا در کاهش خسارت بیماری های ریشه و طوقه که مبارزه با آن بسیار مشکل می باشد موثر می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی یا مراکز جهاد کشاورزی و یا کلینیک های گیاهپزشکی مراجعه نمایید.

